



1




Matériel nécessaire:

pot stérile

fourni par le laboratoire ou par votre médecin.

Ne pas utiliser de récipients domestiques, même propres

2



Le prélèvement s'effectue avant toute prise de médicaments (antibiotiques).

Le prélèvement s'effectue le matin au lever, ou après 2 heures de rétention urinaire au minimum.

ou


minimum 2h

3



Se laver soigneusement les mains avec du savon.

4



Faire une toilette urogénitale avec des compresses stériles et de l'eau du robinet, sans savon.



- Chez la femme: nettoyer la vulve et le méat urinaire.
- Chez l'homme: nettoyer le gland et le méat urinaire.

5



2




- Chez la femme: maintenir les lèvres écartées durant le prélèvement.
- Chez l'homme: maintenir le gland dégagé durant le prélèvement.

1° Uriner le 1er jet dans les toilettes, puis

2° Uriner le reste de la miction dans le pot stérile


(attention de ne pas toucher l'intérieur du pot avec les doigts)

6



Refermer soigneusement le pot. Inscrire votre nom, prénom, date de naissance et la date du prélèvement.

7



Apporter le prélèvement au plus vite au laboratoire.

7 bis

Si nécessaire, le prélèvement peut être conservé durant la nuit au réfrigérateur. Puis l'apporter au laboratoire.

4°C

